

大学の銀杏の葉も色づき始めるころとなりました。  
いつも新型コロナウイルス感染症対策へ御協力をありがとうございます。

こんなに頑張っているのに、新型コロナウイルス感染症の第8波※のはじまりは残念ですよね。

(※静岡県は2022年7月下旬以降の感染流行を「第8波」と表現していましたが、国に合わせて2022年4月以降を一括して「第7波」としました。2022/11/8)

最近、**入構時の検温とアルコール消毒**を忘れてしまう方も多いようです。さらなるご協力をお願い申し上げます。

過去2年いづれも年末年始に感染が拡大しています。

さらに、今冬は季節性インフルエンザとの同時流行が懸念され、より多数の発熱患者が生じる可能性があります。



### ①年内にワクチン接種をご検討ください

#### 【オミクロン株に対応した2価ワクチンの接種】

10/21 から、新型コロナワクチン接種間隔が「最終の接種から3か月以上」に短縮されています。

11/7 財務省は、季節性インフルエンザと同様に一部自己負担(約9600円)の定期接種にするよう検討をもとめています。


#### 【インフルエンザワクチンの接種】

インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは同時接種できます。



### ②発熱など体調不良時に備え、購入しておきたいもの

- ・解熱鎮痛剤
- ・国が承認した抗原定性検査キット (研究用はダメです。医療用か一般用です。)




### ★新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに感染した者がいた場合、

「発熱外来のひっ迫等を回避するため、従業員又は生徒に医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めないこと」

- ・**新型コロナウイルス感染症**に罹患した場合などは、**新型コロナウイルス感染症報告用フォーム入力**と**健康観察表**を提出してください。
- ・**インフルエンザ**に感染した場合は、学生便覧(又は健康支援センターホームページ)の**インフルエンザ罹患証明書**又は**請求書兼、お薬情報、医療費明細書**等を提出してください。

接種可能な間隔が  
**3か月**になりました!  
年内 ぜひ、  
の接種をご検討ください。



(周知動画) ○ねお×木下先生「新しいコロナワクチンのこと聞いてみた」  
<https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg25464.html>


### 接種の対象と使用するワクチン

- 新型コロナの従来株とオミクロン株に対応したワクチン(「オミクロン株対応2価ワクチン」)の接種は、**初回接種(1・2回目接種)を完了した12歳以上の全ての方が対象で、一人1回接種できます。**
- 1・2回目接種を完了した12歳以上で最終接種から3か月以上(※)経過している方は、接種可能になりました。  
(※)5か月から3か月に短縮されました。
- 例えば、9月15日に従来型ワクチンを接種した方は、12月15日からオミクロン株対応2価ワクチンを接種できます。
- 詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

〈オミクロン株対応2価ワクチンの種類〉	1・2回目接種対象者	3回目以降の接種対象者		
			12歳以上	18歳以上
ファイザー社ワクチン [BA.1対応型/BA.4-5対応型]	×(使用不可)	12歳以上	○	○
モデルナ社ワクチン [BA.1対応型]	×(使用不可)	18歳以上	×	○

(※)2022年10月時点では、オミクロン株対応2価ワクチンは、11歳以下は接種対象となりません。

これまで2年間、年末年始に新型コロナは流行しています。**2022年の年末まで**に、重症化リスクの高い高齢者のもとより、**若い方にも**オミクロン株対応2価ワクチンによる接種を完了するようおすすめします。



〈 諸外国において推奨されている、オミクロン株対応ワクチンの前回の接種からの接種間隔 〉 出典:厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より

国	推奨の発表機関(※)	推奨の発表日	前回の接種からの接種間隔
日本	厚生科学審議会	2022/10/20	3か月以上
英国	JCVI	2022/8/15	3か月以上
米国	CDC/FDA	2022/8/31	2か月以上
カナダ	NACI	2022/9/1	3か月以上
イスラエル	保健省	2022/9/20	3か月以上
フランス	保健省	2022/10/6	3か月以上
ドイツ	STIKO	2022/10/6	3か月以上

(※)JCVI: 予防接種・ワクチン合同委員会    CDC: 疾病予防管理センター    FDA: 食品医薬品局  
NACI: 予防接種に関する諮問委員会    STIKO: 予防接種審議会

(2022年10月17日時点)

### オミクロン株対応2価ワクチンの種類と効果


**2種類の2価ワクチン(BA.1対応型/BA.4-5対応型)が使用可能ですが、いずれも従来型ワクチン(※)を上回る効果が期待されます。**

(※)新型コロナの従来株に対応した1価ワクチン

2価ワクチンは、従来株の成分に加え、オミクロン株の成分が含まれています。オミクロン株の成分に2つの種類(BA.1とBA.4-5)があるため、2種類のワクチンがあります。その効果は以下の通りです。

- BA.1、BA.4-5は、いずれもオミクロン株の種類(亜系統)です(右図参照)。そのため、BA.1対応型であっても、BA.4-5対応型であっても、現在流行の中心であるオミクロン株に対しては、1価の従来型ワクチンを上回る効果が期待されています。
- また、BA.1対応型であっても、BA.4-5対応型であっても、**従来株とオミクロン株の2種類の成分があることにより、誘導される免疫も、より多様な新型コロナウイルスに反応すると考えられます。**

〈 新型コロナウイルスの変異株の枝分かれ(系統樹) 〉



(※)出典をもとに改変  
出典: Wang, Q., Guo, Y., Ikemari, S. et al. Antibody evasion by SARS-CoV-2 Omicron subvariants BA.2.12.1, BA.4 and BA.5. Nature 608, 603-608 (2022).

### オミクロン株対応2価ワクチンの安全性

ファイザー社及びモデルナ社の2価ワクチンの薬事承認において、**どちらのワクチンも従来型ワクチンとおおむね同様の症状が見られました。**

出典: 特例承認に係る報告書より抜粋

発現割合	症状	
	ファイザー社	モデルナ社
50%以上	注射部位疼痛	注射部位疼痛、疲労
10~50%	疲労、筋肉痛、頭痛、悪寒、関節痛	頭痛、筋肉痛、関節痛、リンパ節炎、悪寒、悪心・嘔吐
1~10%	下痢、発赤、腫脹、発熱、嘔吐	紅斑・発赤、腫脹・硬結、発熱

- **ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。**  
ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。
- **予防接種健康被害救済制度があります。**  
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」のページをご覧ください。

厚生 コロナ ワクチン
検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

