

HIV(エイズ)検査普及週間 令和4年6月1日~6月7日

HIV (human immunodeficiency virus、ヒト免疫不全ウイルス)
: エイズの原因になるウイルス

エイズ (acquired immunodeficiency syndrome、後天性免疫不全症候群)
: HIVに感染したあと、数年間自覚症状のない時期が続き、その間に病原体などから体を守る免疫が徐々に低下する健康時には感染しない様々な感染症や癌などにかかるようになった状態

HIV検査: エイズ(AIDS)の原因となるHIV(ヒト免疫不全ウイルス)に感染しているかどうかを調べる検査

- 検査は無料、匿名
- 事前電話予約(地域医療課 Tel054-644-9273)
⇒(予約番号を聞く)
- 検査場所: [静岡県/保健所のHIV検査窓口の御案内 \(pref.shizuoka.jp\)](http://pref.shizuoka.jp)
藤枝総合庁舎別館2階
- 日程: [2022年度HIV検査等日程 \(PDF: 39KB\) \(藤枝\)](#)
- 感染から抗体(感染している目印)ができるまでには数週間かかるので、感染の可能性があった機会から3か月以上経過していれば、血液検査でHIV感染の有無がわかる
- 3か月経過せずに検査で「陰性」の場合、HIVに感染していないことを確定するために、3ヶ月以上経過してから再検査が必要

[静岡県/性感染症・エイズの相談と検査 \(pref.shizuoka.jp\)](http://pref.shizuoka.jp)



コンドーム
をしてね!!



HIV検査をきぼう
はたらく細胞
さいほう

早期発見と治療のための
HIV検査編

無症状の期間に感染させて
しまう可能性がある

守る
んだ



◆主な感染経路

- 性的接触(異性間・同性間)による感染
- 血液を介する感染(注射器の共用など)
- 母子感染

HIVは、感染者の血液、精液、膣分泌液、母乳の中に多く含まれるので、これらを介した感染が起こる。

コンドームはHIV感染予防に有効

次のような感染経路では感染しない

- 握手・せき、くしゃみ
- ペットボトルの回し飲み・プール、お風呂
- ドアノブ、電車のつり革 など



詳しくは [こちら!](#)

レッドリボン ライブ RED RIBBON LIVE

性感染症・エイズ相談窓口

- 地域医療課 054-644-9273
- 榛原分庁舎 0548-22-1151

[HIV検査普及週間・特別ライブ! 全世代で考える! レッドリボントークライブ2022 - YouTube](#)

参考: 文部科学省 [16~20 \(mext.go.jp\)](http://16~20.mext.go.jp/)

厚労省: https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000206538_00014.html

内閣府 [エイズはもはや“死の病”ではありません ~早期HIV検査のススメ~ | 政府インターネットテレビ \(gov-online.go.jp\)](#)

HIV検査普及週間 特別ライブ
レッドリボン トークライブ2022
全世代で考える!
6/1(水)20-22時

清水あいり つるの剛士 ひろゆき しょご先生 りゅちell 湯上梨花

●配信: ニコニコ生放送!、Twitterライブ、YouTubeライブ
●主催: 厚生労働省 ●制作: レッドリボンライブ実行委員会、TBSラジオ
●監修: 白根厚典(エイズ予防財団理事) ●MC: プロデュース: レモンさん(山本シェイク) ●コンドームソムリエ: 山本シェイク

ニコニコ生放送、Twitterライブ、YouTubeライブで配信!