



静岡県 新型コロナウイルス感染症

感染爆発

医療ひっ迫警報 発令

2022年8月9日



新規感染者の急増で病床占有率が上がり続け受け入れ医療機関でクラスターが発生し、医療従事者が休職する事態となり一般患者の入院や手術が制限されている。発熱やカゼ症状のある方が、診療所や病院の発熱外来や夜間休日の救急外来に殺到しており、発熱患者さんのみならず、それ以外の一般患者さんにも日常の適切な医療提供ができなくなっている。

① 出来るだけ早くのワクチン接種のお願い



- 12歳以上で3回目はまだの方
- 60歳以上又は60歳未満の基礎疾患のある方で4回目接種が可能な方
- 5歳以上の未接種の方

県民の皆様へ(「自助」の取組)

●早期のワクチン接種

- 3回目にノバックス社製のワクチンを接種した場合の副反応は、ファイザーやモデルナに比べて少ない傾向にあります。
副反応を理由に3回目接種を控えていた方は、ノバックスのワクチン接種をご検討ください。
- 若い方は夏休みやお盆期間の接種を是非ご確認ください



③ 会話や食事の際の適切なマスク着用のお願い

BA5では、マスクなしの会話=(イコール)感染成立となるリスクが高い。
マスクを外しての会話や食事は家族のみ、家族以外の方とは、必ず不織布マスク着用で会話し、会食も完全なマスク会食をお願いします。
酔うとマスク会食ができない場合は、ノンアルコールで!!

●不織布マスクの着用

- 特に多人数、長時間の会話では、お互いに**不織布マスク着用**を徹底して下さい。こまめな換気を行わない場合、BA5の感染力の強さからリスクが高まります。
- 熱中症予防のため、「**屋外では、周りに人がいなければマスクは不要**」
「**就学前の子どもは、マスクは原則不要**」
- 適切なマスクの着脱ができるよう、**常時、マスクの携行**をお願いします。



② 静岡県から適切な受診のお願い

基礎疾患がなくワクチン接種をされている60未満の方はオミクロン株では重症化するリスクが低いので、まずは市販薬(咳止め、解熱剤等)で対応を♡
コロナ以外の緊急性のある疾患の方やコロナで重症化しやすい高齢者や基礎疾患のある方が医療を速やかにうけられるように、ご協力を♡

●適切な受診

- BA5においては、基礎疾患がなく、ワクチンを接種されている60歳未満の方は、自宅での安静と市販薬で自然に治る病気です。
事前に咳止め・解熱剤などの準備をお願いします。
- ***受診しない場合も発症日の後10日間は自宅療養しましょう**
(かつ呼吸器症状が軽快し、解熱剤を使用せず解熱した後72時間経過するまで)
- 救急医療が緊急に必要な人の診療が遅れないように、**夜間・休日は、軽いかぜ症状だけの場合は、受診を控え、平日の日中にかかりつけ医など地域の医療機関を受診してください。**
- 水の事故・交通事故などの事故に注意し、**熱中症にならないように適切に冷房を使用してください。**



④ 自主的な不要不急の外出の控えのお願い

- ご自身で重症化リスクがあると判断されている方
- 仕事や家庭の事情でできる限り感染を避けたい方
必要性を再検討して、できるだけ控えて



●旅行や帰省の際の注意点

- 訪問先での感染リスクの高い行動に注意し、混雑した場所への訪問の回避、不織布マスクの着用、手洗や手指消毒、室内換気の徹底を!!

