



モデルナ社製  
ワクチン ver.

教えて!!



正しく  
知ろう!  
新型コロナ  
ワクチンのこと

発行・監修:  
長野県 新型コロナウイルス  
ワクチン接種アドバイザーチーム  
(2021.6発行)  
接種は無料(公費負担)

モデルナ  
社製ワクチン  
ver.

# 新型コロナウイルスワクチン

どんな流れ?

効果は?

副反応は?

こんな場合接種できるの?

インフルエンザ  
ワクチン接種の  
時期に注意!

こんな人は接種できません

- ✓ 他のワクチンを2週間以内に接種
- ✓ 明らかに発熱(37.5℃以上)
- ✓ 重い急性疾患にかかっている  
(ひどい風邪症状や胃腸炎症状など)



接種  
日程  
相談

接種当日と翌日は  
可能な予定を  
空けておくのが  
おすすめ



2回目は接種できません

- ✓ 1回目のワクチン接種  
でアナフィラキシー



相談

## 接種後も感染対策を。

- 何年も効果が持続するのにはまだ不明
  - 多くの方がワクチン接種完了するまで時間がかかる
- 接種後も従来の感染対策(マスク、人混みを避ける、  
ソーシャルディスタンスなど)を継続しましょう。

## 接種当日

ワクチン接種

接種後  
待機

15分

30分

- 重いアレルギー  
なし15分待機  
あり30分待機

花粉症や喘息などのよくあるアレルギーの方は15分待機で大丈夫

接種後  
当日

- 入浴OK
- 激しい運動は避ける
- 過度なアルコール  
摂取は控える

## 新型コロナワクチンは「筋肉注射」。

肩の筋肉に、垂直に接種します。  
一般的に筋肉注射は皮下注射より痛くないとされています。  
腫れや赤みも出にくく、免疫は付きやすいです。



## 1回目で副反応が出ても2回目接種は可能。

アナフィラキシーなど重い症状でなければ、2回目接種は可能です。  
必ずしも次も同じ症状が出るわけではありません。  
また、副反応予防のためにあらかじめ解熱剤など服用することは推奨されていません。



## 静岡県新型コロナウイルスワクチン接種副反応相談窓口

電話番号: 050-5445-2369

受付時間: 午前9時~午後10時(毎日 土日祝含む)

相談窓口

接種の予約・手続きの方法など  
各市町村接種相談窓口

接種に関する個別の事前相談  
かかりつけ医

参考となるWEB



厚生労働省  
新型コロナワクチン  
についてのQ&A



こびナビ  
新型コロナウイルス感染症や  
そのワクチンに関する正確な  
情報提供プロジェクト  
(医師が中心となって運営)



「コワくんの相談室」  
チャットボット  
ワクチンに関するよくある質問に答える  
LINEのチャットボットを利用した情報  
提供(医師が中心となって運営)



## ワクチンの効果って?

(モデルナ社)

- ✓ 重症化予防効果あり
- ✓ 高齢者への有効性も高い
- ✓ 人にうつす可能性を減らす効果が期待されている

## 発症予防効果

94%



新型コロナワクチンは非常に効果が高いワクチンです

## いつから効くの?



1回目の接種から  
2週間は  
打っていない人と同じ  
と考えて行動を

1回目を接種して2週間経ってから  
効果が出始めます。2回目を接種して14日目以降から  
十分な免疫ができるとされています。  
なお、一度新型コロナウイルスに感染した人も、ワクチン  
に比べて得られた免疫は弱い可能性があるため、接種する  
ことが望ましいです。



# ワクチンの副反応って?

ワクチン接種が原因で起こる反応のことだよ



新型コロナウイルス（モデルナ社）接種後の副反応の出現頻度

副反応はワクチン接種が原因で起こる反応のことです。頻度は日本人が特に多いということはありません。1回目より2回目接種後により強く起こりやすいですが、十分な免疫をつけるには2回接種が望ましいとされています。また、このワクチンを接種しても人の遺伝子に影響が出ることはありません。

## 主な副反応

- 接種時の痛み
- だるさ
- 頭痛
- 筋肉痛
- 寒気
- 発熱
- 接種部位の腫れ
- 関節痛
- 吐き気

**いつ出る?** 主な副反応は通常1～2日で出現し、3日以内に改善することが多いです。接種後1週間ほどしてから（他の副反応より遅めのタイミングで）腕が赤く腫れることがあり、この反応は平均4～5日で改善します。特に2回目接種後は発熱を含めた副反応が起きやすいので、接種当日と翌日は、可能なら予定を空けておくことをおすすめします。

**どんな症状?** 主に接種部位の痛み・腫れ・だるさ・頭痛・筋肉痛・発熱などがあり、発熱以外に悪寒や関節痛が出る場合も。接種直後の痛みはそれほど強くありません。発熱時は解熱剤を使っても構いません（ワクチンの効果は下がりにくいです）。解熱剤はアセトアミノフェンを含むものをおすすめ。

副反応が出てよく来る症状なら様子を見て落ち着いた手帳を

## 体調が回復しない場合は?

咳やのどの痛み、息切れなどの症状が見られたら上気道炎（風邪）や新型コロナウイルス感染症等の可能性も。（これらがワクチンの副反応で通常見られないため）

こんな時は医療機関に相談

- ☑ 接種後2日以上経っても解熱しない
- ☑ 症状が重い

# アナフィラキシーって?

簡単に言うと「重いアレルギー反応」のことで、ワクチン接種などの後、短時間で以下の2つ以上の症状が出現する場合を「アナフィラキシー」といいます。新型コロナウイルスワクチンで起こる頻度は35万接種に1回で、70%が15分以内、90%が30分以内に起こるとされます。

- 皮膚・粘膜症状（発疹、発赤、かゆみ）
- 消化器症状（腹痛、嘔吐）
- 循環器症状（血圧低下・意識障害）
- 呼吸器症状（呼吸が苦しい、呼吸をすときにゼイゼイする など）

多いのは皮膚・粘膜症状（80～90%）

90%が30分以内に起こるとされています

## アナフィラキシーショックって?

アナフィラキシーのうち血圧低下や意識レベル低下を伴うもの。

## アナフィラキシーは治療できます

治療により回復し、後遺症は残りません。



アドレナリンの筋肉注射

必要なら酸素投与

横になって安静

## こんな場合接種できるの?

	接種	
当日の発熱	×	当日、明らかに発熱（37.5℃以上）している場合、接種不可。
重い急性疾患	×	ひどい風邪症状や胃腸炎症状など、急性疾患の強い症状がある場合、接種不可。
他のワクチンを2週間以内に接種	×	インフルエンザなど他のワクチンを2週間以内に接種している場合、接種不可。（ワクチン接種後も、2週間他のワクチンを接種することはできません。）
アレルギー	○	食物（卵含む）・ペット・ハウスダストのアレルギーや、経口薬へのアレルギーがある場合でも接種は可能。
花粉症	○	花粉症でも接種は可能。
基礎疾患	○	心臓、腎臓、肝臓、血液疾患などの基礎疾患のある方はコロナで重症化しやすい。不安な場合はかかりつけ医に相談を。
妊娠中	○	妊娠中でも接種可。妊娠中は感染で重症化のリスクがあり、接種を推奨。不安な場合はかかりつけ医に相談を。お腹の中の赤ちゃんに悪い影響が出たり、将来妊娠しにくくなることは考えられておらず、海外からもそのような報告はない。
授乳中	○	現時点で特段の懸念が認められているわけではなく海外でも接種の対象。不安な場合はかかりつけ医に相談を。
12歳未満*	×	ワクチンは12歳以上で承認されており、現在は接種対象ではないが、将来的には対象年齢が広がる可能性も。*
薬を内服中	○	内服中の薬により接種できないということはない。不安な場合はかかりつけ医に相談を。
…抗凝固薬	○	抗凝固薬（血液をさらさらにする薬）を飲んでいる場合は2分以上接種した場所をしっかりと押さえる。
手術後	○	直後でなければ基本的に可能。投薬中の方など、かかりつけ医と相談を。
1回目の接種後副反応が出た	○	アナフィラキシーなど重い症状でなければ、強い腫れ・熱などの副反応があっても、2回目は可能。同じ場所に接種可能。
1回目の接種後アナフィラキシー	×	アナフィラキシーとはワクチン接種などの後、短時間で以下の2つ以上の症状が出現すること。接種不可。 皮膚・粘膜症状（発疹、発赤、かゆみ） 循環器症状（血圧低下・意識障害） 呼吸器症状（呼吸が苦しい、嘔吐）

※1 <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035368>  
 参照元: <https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasetosh/20210120-00217893/>  
 CDC Interim Clinical Considerations for Use of mRNA COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States. 厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A

\*2021年7月19日、厚生省が12歳以上を了承したので修正